

MATERIAL SUPLEMENTARIO




Figura 1S. Incidencia de infección gonocócica en España 1995-2024

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica) [7].

Tabla 1S. Descripción clínica de los casos de artritis gonocócica en el área SEINORTE 2013-2023

Sexo	Edad	Año	Localización artritis	Tenosinovitis, artralgias	Dermatitis	VIH	Hemocultivos	Bioquímica del líquido articular	Identificación Microbiológica	Otras localizaciones de detección NG	Necesidad de limpieza	AB LV (Días)	AB VO (Días)	Tiempo total de TTO AB al alta (Días)	Dolor (Eva) al alta	Curación
1	V	56	2023	Rodilla x2 Esterno clavicular x2	Codo Muñecas x2 Tobillos x2	PIES	No	(-)	CÉLULAS 95.000/mm ³ PMN 80% GLUCOSA 50 mg/dL	PCR (+) CULTIVO (+)	No	14 CRO	14 CEFI	28	6	Sí
2	M	39	2022	Cadera	Hombros x2 Muñeca Rodilla Tarso	Piernas	No	(-)	CÉLULAS 93.320 / mm ³ PMN 95% GLUCOSA 16 mg/dL	PCR (+) CULTIVO (+)	No	14 CRO	14 CEFI	28	7-8	Sí
3	M	40	2022	Muñeca	-	-	No	(-)	CÉLULAS 44.336 / mm ³ PMN 83% GLUCOSA no valorable	CULTIVO (+)	No	11 CRO	10 CEFI (+DOXI 7 Días)	21	4	Sí
4	V	52	2017	Rodilla	Muñeca	-	No	(-)	CÉLULAS 62.100 / mm ³ PMN 100% GLUCOSA 73 mg/dL	CULTIVO (+)	No	1 IM CRO	7 CEFI	7	6	Sí
5	M	34	2020	Cadera	-	-	No	NR	CÉLULAS 89.100 / mm ³ PMN 96,9% GLUCOSA 9 mg/dL	PCR (+) CULTIVO (+)	Sí	10 CRO	0	10	0	Sí
6	M	36	2021	Codo	-	-	No	NR	-	CULTIVO (+)	Sí	7 CRO	7 CEFI	14	3	Sí
7	V	39	2022	Rodilla	Tobillo Codo Muñeca	-	No	NR	CÉLULAS 29.354/ mm ³ PMN 93% GLUCOSA 52 mg/dL	CULTIVO (+)	Sí	4 CRO	10 CEFI	14	6	Pérdida de seguimiento
8	V	45	2020	Muñeca	Carpó	Carpó	Sí	(-)	-	PCR (+) CULTIVO (-)	No	21 IM + 21 IV CRO	0	42	0	Sí
9	V	47	2021	Muñeca Rodilla	-	-	No	(-)	CÉLULAS 107.960 / mm ³ PMN 95% GLUCOSA 70 mg/dL	PCR (+) CULTIVO (+)	Drenaje ecoguiado x2	8 CRO	9 CEFI	17		Sí

...continuación de la tabla 1S.

Sexo	Edad	Año	Localización artritis	Tenosinovitis, artralgias	Dermatitis	VIH	Hemocultivos	Bioquímica del líquido articular	Identificación Microbiológica	Otras localizaciones detección NG	Necesidad de limpieza	AB LV (Días)	AB VO (Días)	Tiempo total de TTO AB (Días)	Dolor (Eva) al alta	Curación
10	M	39	2013	Codo Tobillo	Codo	No	(-)	CÉLULAS 102.970/ mm ³ PMN 96% GLUCOSA 8 mg/dL	PCR (+) CULTIVO (-)	-	Drenaje ecoguiado x2	5 CRO	10 CEFI	15	-	Pérdida de seguimiento
11	V	31	2013	Radiocarpiano Tobillo Tarso Caderas x2	Carpó	No	(-)	-	CULTIVO (+)	-	No	28 CRO	14 DOXI	42	-	Sí
12	V	54	2016	Rodilla Radiocarpiana x2 Tobillo x2	-	No	NR	-	CULTIVO (+)	-	No	14 IV + 7 IM CRO	-	21	-	Sí
13	M	50	2017	Rodilla	-	No	NR	CÉLULAS 144.992/ mm ³ PMN 89% GLUCOSA 4 mg/dL	CULTIVO (+)	-	No	14 CRO	-	14	-	Sí
14	V	32	2021	Radiocarpiano	-	No	(-)	CÉLULAS 80.000/ mm ³ PMN 90% GLUCOSA <6 mg/dL	CULTIVO (+)	-	No	21 CRO	21 CiP	42	-	Sí
15	M	49	2023	Tobillo Hombro Tarso bilateral Radiocarpiana x2	Hombro Tobillo x2 Radiocarpiana x2	No	(-)	CÉLULAS 54.814/ mm ³ PMN 84% GLUCOSA 44 mg/dL	PCR (+)	Faringe	No	9 CRO	6 CEFI	15	3	Sí

ND: dato no disponible; M: mujer; V: varón; PMN: polimorfonucleares; NR: No realizados; CRO: Ceftriaxona; CEFI: cefixima; DOXI: Doxiciclina; CiP: ciprofloxacino.

Tabla 2S. Sensibilidad antibiótica (CMI) en aislados de *N. gonorrhoeae*

	PEN	CTX	CFM	CRO	AZM	TET	CIP	SPT
1	I (0,5)	S (0,064)		S	S (1)	R (1)	R (3)	S (12)
2	I (0,19)	S (0,016)			R (1,5)	R (0,75)	R (4)	S (8)
3	R (4)	S	S (0,064)	S (0,012)		R (24)	R (0,5)	
4	R	S ($\leq 0,012$)			S ($\leq 0,064$)	R (48)	R (4)	
5	R (>32)	S (0,003)			S (0,094)	R (24)	R (2)	
6	I (0,25)	S (0,003)			R (12)	S (0,5)	R (2)	
7	R (12)	S (0,008)			S (0,094)	R (1,5)	R (4)	
8	R (8)		S (0,125)	S (0,047)	S (0,25)	R (64)	R (0,75)	
9	I (0,25)			S (0,06)			S (0,003)	S (8)
10	R (32)			S (0,016)	S (0,01)		R (2)	S (4)
11	S (0,25)			S (0,01)	R (2)		S (0,01)	S (8)
12	S (0,12)			S (0,01)	S (0,25)	S (0,5)	S (0,01)	S (8)

PEN: penicilina; CTX: cefotaxima; CFM: cefixima; CRO: ceftriaxona; AZM: azitromicina; TET: tetraciclina; CIP: ciprofloxacino; SPT: espectinomicina.